

**BULLETIN**  
**du MUSÉUM NATIONAL**  
**d'HISTOIRE NATURELLE**

**PUBLICATION BIMESTRIELLE**

**zoologie**

**281**

**N° 404 SEPTEMBRE-OCTOBRE 1976**

**BULLETIN**  
**du**  
**MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE**

57, rue Cuvier, 75005 Paris

---

Directeur : Pr M. VACHON.

Comité directeur : Prs J. DORST, C. LÉVI et R. LAFFITTE.

Rédacteur général : Dr M.-L. BAUCHOT.

Secrétaire de rédaction : M<sup>me</sup> P. DUPÉRIER.

Conseiller pour l'illustration : Dr N. HALLÉ.

---

Le *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, revue bimestrielle, paraît depuis 1895 et publie des travaux originaux relatifs aux diverses branches de la Science.

Les tomes 1 à 34 (1895-1928), constituant la 1<sup>re</sup> série, et les tomes 35 à 42 (1929-1970), constituant la 2<sup>e</sup> série, étaient formés de fascicules regroupant des articles divers.

A partir de 1971, le *Bulletin* 3<sup>e</sup> série est divisé en six sections (Zoologie — Botanique — Sciences de la Terre — Sciences de l'Homme — Sciences physico-chimiques — Écologie générale) et les articles paraissent, en principe, par fascicules séparés.

S'adresser :

- pour les **échanges**, à la Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (C.C.P., Paris 9062-62) ;
- pour les **abonnements** et les **achats au numéro** à la Librairie du Muséum, 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (C.C.P., Paris 17591-12 — Crédit Lyonnais, agence Y-425) ;
- pour tout ce qui concerne la **rédaction**, au Secrétariat du *Bulletin*, 57, rue Cuvier, 75005 Paris.

Abonnements pour l'année 1976

ABONNEMENT GÉNÉRAL : France, 530 F ; Étranger, 580 F.

ZOOLOGIE : France, 410 F ; Étranger, 450 F.

SCIENCES DE LA TERRE : France, 110 F ; Étranger, 120 F.

BOTANIQUE : France, 80 F ; Étranger, 90 F.

ÉCOLOGIE GÉNÉRALE : France, 70 F ; Étranger, 80 F.

SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES : France, 25 F ; Étranger, 30 F.

*International Standard Serial Number (ISSN) : 0027-4070.*

*Serpula (Paraserpula) israelitica*,  
nouvelle espèce de Serpulidae (Annélides Polychètes)  
et une petite collection annélidienne de la Méditerranée orientale

par Louis AMOUREUX \*

**Résumé.** — Analyse d'une collection de 400 Annélides Polychètes de la région de Haïfa. 100 espèces sont reconnues à travers les 19 stations étudiées. 36 sont nouvelles pour la région et, parmi elles, trois le sont pour la Méditerranée. L'une des trois, *Serpula (Paraserpula) israelitica*, nouvelle pour la Science, est décrite à partir des cinq spécimens présents.

**Abstract.** — Here is an analysis of 400 Polychaete worms collected in 1974-1975 near Haifa (Eastern Mediterranean). One hundred species are recognized. One of those is absolutely new, *Serpula (Paraserpula) israelitica*. Two others had never been seen in the Mediterranean and 36 were unknown in that area. The list of species and a diagnosis of the new species are given in the paper, with illustrations.

---

Nous analysons ici un ensemble d'environ quatre cents Annélides Polychètes recueillis dans le voisinage de Haïfa par M. MOSHE TOM, de l'Université de Tel-Aviv. Nous le remercions de nous avoir confié cette étude et des renseignements qu'il nous a donnés sur les stations et les moyens de capture.

NOTES SUR LES STATIONS ET MOYENS DE CAPTURE

Dix-neuf stations différentes ont été prospectées à une ou plusieurs reprises entre le 15 avril 1974 et le 14 mai 1975 (fig. 1). Selon MOSHE TOM, elles se répartissent en trois groupes :

— Les stations 1 et 4, à 10 et 18 m de profondeur. Ce sont des fonds rocheux très sommairement prospectés.

— Les stations 2, 3, 5 et 6. Elles se situent entre 20 et 35 m de profondeur. C'est une plaine subhorizontale à sédiment sableux assez homogène à peu près dépourvue de végétation.

— Les stations 7 à 19. Elles sont un peu plus éloignées de la côte et plus profondes (de 35 à 80 m). Le milieu est beaucoup moins homogène que sur les stations précédentes et la pente est assez accentuée. L'élément de beaucoup le plus important est la vase, ou parfois la vase sableuse molle, mais on y rencontre, en proportions très diverses selon les points, soit des végétations algales

\* Laboratoire de Zoologie, Université Catholique de l'Ouest, Place André-Leroy, B.P. 858, 49005 Angers.




FIG. 1. — Carte des stations prospectées au large d'Acre et d'Haïfa.  
Les chiffres indiquent les numéros des stations.

et principalement des *Caulerpa scalpelliformis*, soit des masses dures de tailles diverses d'origine animale : amas de Serpuliés, de Vermetes, de Bivalves, de Bryozoaires ou même quelques coraux. Les uns et les autres (végétaux et débris animaux) sont très souvent colonisés d'Éponges et forment autant de biotopes divers pour la faunule vagile.

Au cours des treize journées de prospections échelonnées durant l'année, on a utilisé comme procédés de collecte : le seaphandre autonome, la benne de Petersen (0,1 m<sup>2</sup>), une drague à ouverture triangulaire de 60 cm de côté, des chaluts à perche de 1,20 m de largeur. Nous préciserons ces moyens pour chacune des stations.

#### LISTE DES ESPÈCES PRÉSENTES DANS LA COLLECTION

Les quelque quatre cents Annélides Polychètes de cette collection se répartissent très irrégulièrement entre cent espèces environ, dont nous donnons la liste selon l'ordre de la Faune de France (FAUVEL, 1923 et 1927). A la suite de chaque espèce on indique, entre parenthèses, le nombre de vers lorsqu'il y en a plus d'un ; puis, nous donnons brièvement quelques explications pour les seules espèces présentant des variantes écologiques ou morphologiques intéressantes.

## APHRODITIDAE

*Hermione hystrix* (Savigny, 1820) (10 ex.)

Selon BELLAN (1964), l'espèce exige une fraction sédimentaire assez grossière non négligeable. Ici, l'espèce a été trouvée dans des milieux vaseux.

*Pontogenia chrysocoma* (Baird, 1865)

*Lepidonotus clava* (Montagu, 1808) (2 ex.)

*Harmothoe* sp. (dépourvu d'élytres)

*Scalisetosus pellucidus* (Ehlers, 1864) (8 ex.)

*Acholoe astericola* (delle Chiaje, 1841) (fragment dans les ambulacres d'un *Astropecten*)

*Eupanthalis kinbergi* McIntosh, 1876

*Sigalion mathildae* Audouin & Milne-Edwards, 1832 (7 ex.)

*Leanira ylleni* Malmgren, 1867 (2 ex.)

## CHRY SOPETALIDAE

*Chrysopetalum debile* Grube, 1855

*Bhawaniana reyssi* Katzmann, Laubier & Ramos, 1974 (6 ex.)

Ces 6 individus, tous semblables et de même provenance, diffèrent nettement du précédent ; leurs soies sont de trois types différents : soies supérieures, à long article terminal en fine arête ou serpe pectinée ; soies inférieures, à article faiblement très court et tranchant, lisse ; entre les deux, des soies de forme intermédiaire... Les palées ont un apex presque arrondi, sans pointe ; les deux bords latéraux sont dentelés et l'on ne compte que 12 à 14 côtes longitudinales, tantôt lisses, tantôt dentelées.

## AMPHINOMIDAE

*Eurythoe complanata* (Pallas, 1766) (5 ex.)

*Hermodice carunculata* (Pallas, 1766) (18 ex.)

*Euprosyne armadillo* Sars, 1851

## PHYLLODOCIDAE

*Phyllodoce vittata* Ehlers, 1864

*Phyllodoce* sp. (2 ex.)

*Paralacydonia paradoxa* Fauvel, 1913 (2 ex.)

Contrairement à ce qu'indique FAUVEL, ces deux exemplaires ont deux petits yeux bien observables, en position occipitale.

## SYLLIDAE

*Haplosyllis spongicola* (Grube, 1855) (14 ex. à cirres dorsaux de moins de 30 articles)

*Syllis gracilis* Grube, 1840

*Typosyllis hyalina* (Grube, 1865) (5 ex.)

*Typosyllis armillaris* (Müller, 1774)

*Ehlersia cornuta* (Rathke, 1843)

*Trypanosyllis zebra* (Grube, 1860)

*Odontosyllis fulgurans* Claparède, 1864 (4 ex.)

Eusyllinae indéterminable et Syllidae indéterminables (2)

## NEREIDAE

*Leptonereis glauca* Claparède, 1870

*Neanthes caudata* (delle Chiaje, 1828)

*Nereis rava* Ehlers, 1868 (5 ex.)

*Ceratonereis costae* (Grube, 1840)

*Ceratonereis* sp.

Cet exemplaire tronqué a des œufs et des soies en palette. Il possède l'armature buccale des *Ceratonereis*, deux languettes aux rames antérieures dorsales et possède une soie homogompe dorsale en serpe, de longueur moyenne, sur quelques pieds postérieurs du fragment, mais les serpes ventrales hétérogomphes sont beaucoup plus courtes. Les cirres dorsaux, très courts, excluent l'appartenance à *C. mirabilis*.

*Ceratonereis mirabilis* Kinberg, 1866 (8 ex.)

Ces exemplaires présentent beaucoup de ressemblance avec les *N. rava* de cette collection, en ce qui concerne les soies, mais l'armature buccale est nettement celle de *Ceratonereis* : totalement dépourvue de paragnathes à l'anneau oral. C'est, sauf erreur, la première signalisation en Méditerranée.

*Platynereis dumerilii* (Audouin & Milne-Edwards, 1833)

Nereidae sp. (1 ex.)

## NEPHTYIDAE

*Nephtys hombergii* Savigny, 1818

*Nephtys hystricis* Mc Intosh, 1908 (2 ex.)

*Nephtys* sp. (intermédiaire entre *N. hombergii* et *N. incisa*)

*Micronephtys stanmeri* Augener, 1932

## GLYCERIDAE

*Glycera convoluta* Keferstein, 1862.

*Glycera tessellata* Grube, 1863 (5 ex.)

*Glycera capitata* Oersted, 1843

*Glycera rouxii* Audouin & Milne-Edwards, 1833 (4 ex.)

*Glycera unicornis* Savigny, 1818

## EUNICIDAE

*Eunice torquata* Quatrefages, 1865 (3 ex.)

*Eunice vittata* delle Chiaje, 1828 (56 ex., tous de petite taille, entre 5 et 20 mm)

*Eunice tubifex* Crossland, 1904 (2 ex.)

Ces deux exemplaires tranchent d'emblée sur toutes les autres *Eunice* de la collection par leurs soies inférieures qui sont des soies composées à article terminal, non pas en serpe mais cultriforme, du moins dans la partie antérieure de l'animal, car à la partie postérieure ce type de soies cultriformes disparaît et l'on retrouve à leur place les serpes composées, bidentées et encapuchonnées. Cette partie terminale n'a été observée que dans l'un des deux exemplaires, le seul qui soit complet. La branchie débute au 19<sup>e</sup> pied et ne comporte qu'un filament sur le fragment plus petit, limité à 50 sétigères antérieurs. Sur l'autre, plus gros, on a d'abord la branchie à un seul filament à partir du 25<sup>e</sup> pied, mais la partie postérieure (où les soies composées redeviennent des soies en serpe) a régulièrement deux filaments par branchie et quelquefois trois. Bien que l'armature buccale soit un peu différente de ce qu'indique CROSSLAND (ici, M 1 = crocs, M 2 = 4 + 5, M 3 = 3 + 0, M 4 = 2 + 3, M 5 et M 6 sont des plaques noirâtres), nous laissons ces deux exemplaires dans l'espèce décrite par lui. C'est, sans doute, la première signalisation pour la Méditerranée.

*Eunice* sp.

*Marphysa bellii* (Audouin & Milne-Edwards, 1834)

*Lysidice ninetta* Audouin & Milne-Edwards, 1833 (3 ex.)

*Nematonereis unicornis* (Grube, 1840)

*Diopatra neapolitana* delle Chiaje, 1841 (2 ex.)

*Hyalinoecia tubicola* (Müller, 1788) (10 ex. du même point)

*Hyalinoecia bilineata* Baird, 1870

*Hyalinoecia grubii* Marenzeller, 1886 (3 ex.)

*Hyalinoecia fauveli* Rioja, 1918 (4 ex.)

*Hyalinoecia brementi* Fauvel, 1916 (4 ex.)

BELLAN (1964 : 94-99) semble peu convaincu de la validité de ces cloisons spécifiques entre les *Hyalinoecia bilineata*, *grubii*, *fauveli* et *brementi* et je partage de plus en plus son point de vue, les considérant seulement comme des phénotypes divers d'une unique espèce. Dans les 12 exemplaires ici répartis entre ces trois formes, je note que les soies composées sont toutes tridentées aux 5 ou 6 premiers sétigères. *H. bilineata* présente les deux lignes rougeâtres longitudinales qui lui valent son nom et la branchie apparaît au 5<sup>e</sup> sétigère. Chez les *H. grubii*, la branchie débute au 4<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> sétigère et les dessins sont des lignes transversales continues ou discontinues. *H. fauveli* a sa branchie présente dès le premier sétigère et les dessins y sont en forme de taches circulaires, mais avec une netteté et une distribution bien moins rigoureuse que dans les exemplaires de l'Atlantique que j'ai analysés lors des prospections de la « Thalassa ». Sur les *H. brementi* de cette collection, c'est au 3<sup>e</sup> sétigère que débute la branchie ; les taches colorées sont nettement discontinues, d'abord circulaires, puis étirées dans le sens transversal.

*Lumbrineris gracilis* (Ehlers, 1898) (5 ex.)

*Lumbrineris adriatica* Fauvel, 1940 (2 ex.)

Les soies composées de cette espèce sont des soies cultriformes et non des serpes bidentées. Les troisièmes mâchoires ont deux dents et les quatrièmes n'en ont qu'une.

*Lumbrineris* sp.

*Driloneris filum* Claparède, 1870 (2 ex.)

*Staurocephalus rubrovittatus* Grube, 1855

Eunicidae sp. (6 ex. très abîmés)

## ARICIIDAE

*Scoloplos (Leodamas) chevalieri candiensis* Harmelin, 1969

Par ses soies capillaires et ses crochets érantés, par la présence d'un acicule à la rame ventrale, ce fragment antérieur de 10 mm s'accorde mieux avec la variété créée par HARMELIN pour des exemplaires de l'île de Crète qu'avec la forme typique décrite par FAUVEL.

## SPIONIDAE

*Spiophanes kroyeri reyssi* Laubier, 1964 (9 ex.)

Ces 9 exemplaires incomplets appartiennent bien à la sous-espèce que LAUBIER indique « de vases bathyales ». Ici, elle a été recueillie, pour 8 exemplaires, en des fonds sableux de 30 à 35 m de profondeur.

*Prionospio ehlersi* Fauvel, 1928 (2 ex.)

Spionidae sp. (deux fragments antérieurs à prostomium pointu, avec apparition de crochets ventraux tridentés au 14<sup>e</sup> sétigère)

## DISOMIDAE

*Poecilochaetus serpens* Allen, 1904

## PARAONIDAE

*Paraonis gracilis* Tauber, 1879

*Paradoneis armata* Glémarcc, 1967

*Aricidea* sp. (2 ex.)

## CIRRATULIDAE

*Audouinia filigera* (delle Chiaje, 1828) (29 ex.)

*Tharyx heterochaeta* (Laubier, 1961) (6 ex.)

Les six exemplaires sont incomplets, mais le fragment présent s'accorde parfaitement avec les remarques et descriptions de LAUBIER : les soies, toutes capillaires, sont d'abord lisses sur les deux bords latéraux. C'est seulement entre le 11<sup>e</sup> et 14<sup>e</sup> sétigère qu'elles deviennent crénelées sur l'un de ces bords, en restant lisses sur l'autre. Le changement commence aux rames ventrales. LAUBIER considérait l'espèce comme caractéristique des vases terrigènes côtières. Deux de nos exemplaires proviennent de fonds sableux à 30 m ; les quatre autres de zones envasées à 60-80 m. *Tharyx murioni* Saint-Joseph, 1894

Cirratulidae sp.

## SCALIBREGMIDAE

*Sclerocheilus minutus* Grube, 1863

## CAPITELLIDAE

*Notomastus latericeus* Sars, 1851 (3 ex.)

*Leiocapitella dollfusi* (Fauvel, 1936)

*Pseudoleiocapitella fauveli* Harmelin, 1964

Un exemplaire filiforme, tronqué, de 3 cm de longueur, à prostomium conique et segment buccal achète. Viennent ensuite un premier sétigère à soies dorsales capillaires sans rame ventrale ; neuf sétigères, à soies capillaires exclusivement, aux deux rames, dorsale et ventrale ; puis deux sétigères à soies dorsales capillaires et crochets ventraux encapuchonnés. Le genre avait été créé par HARMELIN pour des individus trouvés dans les « mattes » d'herbiers à Posidonies de la région de Marseille. Notre exemplaire vient d'un fond vaseux de 60 m.

## MALDANIDAE

*Clymene (Praxillella) gracilis* Sars, 1861 (3 ex. fragmentaires)

*Clymene* cf. *lumbricoides* Quatrefages, 1865

C'est un fragment antérieur de 3 cm, avec les 11 premiers sétigères, au limbe céphalique très nettement festonné dans sa région dorsale.

*Clymene oerstedii* Claparède, 1863

*Clymene* cf. *lophosetosa* Orlandi, 1898

Déterminé à partir d'une région postérieure comportant le dernier sétigère, trois antéaux achètes et un pygidium de forme conique avec un entourage de 24 cirres : 23 sont subégaux, le 24<sup>e</sup>, en position ventrale, mesure le double des autres.

*Leiochone tricirrata* Bellan et Reys, 1967 (4 ex. incomplets ou fragmentés)

*Rhodine* cf. *gracilior* Tauber, 1879 (4 ex. incomplets, déterminables par leurs uncini en rangées doubles et les collerettes lisses des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> sétigères)

Maldanidae sp. (De nombreux fragments correspondant à une vingtaine d'individus au minimum, tantôt Clymeninae à tête plate limbée, tantôt Nichomaehinae)



## OWENIIDAE

*Owenia fusiformis* delle Chiaje, 1841 (3 ex.)

## STERNASPIDIDAE

*Sternaspis scutata* (Renier, 1807)

## AMPHICTENIDAE

*Lagis koreni* Malmgren, 1866

## AMPHARETIDAE

*Amphicleis gunneri* (Sars, 1835) (5 ex.)

## TEREBELLIDAE

*Terebella lapidaria* Linné, 1767

*Polymnia nesidensis* (delle Chiaje, 1828) (3 ex.)

*Nicolea venustula* (Montagu, 1818) (9 ex.)

*Lanice conchilega* (Pallas, 1766)

*Pista* sp. (2 ex.)

Ces deux exemplaires de 15 et 20 mm n'ont qu'une seule paire de branchies en pompons comme chez *P. cristata*. Ils ont également 17 sétigères thoraciques à soies capillaires et des uncini en rangs doubles sur 10 uncinigères. Les deux exemplaires ont également des lobes parapodiaux aux segments 2, 3, 4 ; mais ces lobes ont davantage la forme qu'on leur trouve en *P. mirabilis*, laquelle n'a que 16 sétigères thoraciques. DAY (1963 : 438 ; 1967 : 737) indique une *P. unibranchia* porteuse de lobes branchiaux semblables à ceux que nous avons ici et chez laquelle les uncini n'ont pas de prolongement chitinisé, ce que nous avons ici encore sur l'un des exemplaires ; mais *P. unibranchia* n'a qu'une branchie. Ici, il y en a certainement une paire.

*Polycirrus* cf. *caliendrum* Claparède, 1868 (3 ex.)

*Terebellides stroemi* Sars, 1835 (3 ex.)

## SABELLIDAE

*Potamilla torelli* Malmgren, 1865

*Potamilla reniformis* (Müller, 1788) (3 ex.)

*Laonome* sp.

L'unique exemplaire de cette collection s'accorde assez bien avec *L. kroyeri* par l'ensemble de ses caractères, mais il n'a que quatre sétigères thoraciques ; il semble cependant complet, avec son panache, et mesure 20 mm de longueur.

*Dasychone lucullana* (delle Chiaje, 1828)

*Jasmineira elegans* Saint-Joseph, 1894 (3 ex.)

Sabellinae sp. (3 ex. très fragmentaires)

## SERPULIDAE

*Serpula vermicularis* Linné, 1767 (2 ex.)

*Serpula concharum* Langerhans, 1880 (5 ex.)

*Serpula (Paraserpula) israelitica* (5 ex.)

Cette espèce, nouvelle, sera décrite plus loin.

*Hydroïdes pseudouncinata* Zibrowius, 1968

*Vermiliopsis infundibulum* (Philippi, 1844) (3 ex.)

*Vermiliopsis richardi* Fauvel, 1909

*Pomatoceros triqueter* (Linné, 1767)

*Spirobranchus polytrema* (Philippi, 1844)

*Spirobranchus coutieri* (Gravier, 1908) (2 ex.)

Dans cette espèce, l'opercule se termine en coupe très peu concave et sans aucune aspérité ; de plus, les ailerons du pédoncule sont laciniés. Des exemplaires avaient été signalés par LAUBIER, dans la région de Beyrouth.

*Protula tubularia* (Montagu, 1803) (5 ex.)

#### DISTRIBUTION PAR STATION

**Station 1** : fond rocheux à 10 m de profondeur. Un seul annélide recueilli au chalut à perche : *Phyllodoce* sp.

**Station 2** : fond horizontal sableux, sans végétation, à 31-34 m de profondeur. Échantillons recueillis en plongée avec scaphandre.

*Pontogenia chrysocoma*, *Sigalion mathildae* (7), *Nephtys hombergii*, *Micronephthys stam-meri*, *Diopatra neapolitana*, *Drilonereis filum*, Eunicidae et lumbrinerinae sp., *Spiophanes kroyeri* (6), *Spiophanes bombyx*, *Audouinia filigera*, *Notomastus latericeus*, *Clymene oerstedii*, *Lanice conchilega*, *Laonome* sp.

**Station 3** : même type de substrat que la station 2, profondeur 28 m. Captures à la benne de Petersen.

*Glycera convoluta*, *Eunice vittata* (2), *Diopatra neapolitana*, *Paradoneis armata*, *Audouinia filigera* (26), *Owenia fusiformis* (2), *Jasmineira elegans*.

**Station 4** : fond rocheux à 18 m. Captures à la drague.

*Lepidonotus clava* (2), *Eurythoe complanata* (5), *Eunice torquata*, *Vermiliopsis infundibulum*, *Spirobranchus coutieri* (2).

**Station 5** : plaine sableuse sans végétation, à 30 m de profondeur. Prélèvements à la benne de Petersen et surtout au chalut à perche.

*Glyceru capitata*, *Glycera rourii*, *Eunice vittata*, *Hyalinoecia grubii* (2), *Lumbrineris gracilis*, *Scoloplos chevalieri candiensis*, *Spiophanes kroyeri*, *Poecilochaetus serpens*, *Tharyx heterochaeta* (2), *Clymene ? lophosetosa*, Maldanidae sp., *Lagis koreni*, *Jasmineira elegans*.

**Station 6** : fond plat sableux sans végétation, à 24 m de profondeur ; captures au chalut à perche. *Ceratonereis mirabilis*.

**Station 7** : fond sablo-vaseux à 40 m, avec abondante végétation d'algues, notamment *Caulerpa scalpelliformis* et quelques blocs durs organogènes.

*Scalissetosus pellucidus* (8), *Harmothoe* sp., *Chrysopetalum debile*, *Typosyllis hyalina*, *Ehlersia cornuta*, *Odontosyllis fulgurans* (2), *Leptonereis glauca*, *Ceratonereis mirabilis*, *Platynereis dumerilii*, Nereidae sp., *Eunice vittata* (4), *Nematonereis unicornis*, Eunicidae sp., Maldanidae sp., *Nicolea venustula* (3), *Serpula concharum* (2), *Spirobranchus polytrema*.

**Station 8** : fond sablo-vaseux à 45 m de profondeur, avec *Caulerpa scalpelliformis* et blocs biogènes. Prélèvements à la benne de Petersen.

*Hermione hystrix* (5), *Odontosyllis fulgurans*, Eusyllinae sp., *Eunice vittata* (3), *Eunice tubifex*, *Hyalinoecia grubii*, *Hyalinoecia brementi* (2), Spionidae, Maldanidae, Cirratulidae, *Jasmineira elegans*, *Serpula concharum*, *Serpula (Paraserpula) israelitica*.

**Station 9** : même biotope que les deux stations précédentes, à 45-47 m ; prélèvements au chalut, à la drague et à la benne de Petersen.

*Hermodice carunculata* (14), *Ceratonereis mirabilis*, *Hyalinoecia tubicola* (10), *Lumbrineris gracilis*, *Leiocapitella dollfusi*, *Nicolea venustula* (2), *Vermiliopsis infundibulum*, *Pomatoceros triqueter*, *Protula tubularia*.

**Station 10** : fond de vase avec nombreux blocs biogènes, formations algales peu importantes. Prélèvements au chalut et à la drague, 50 m de profondeur.

*Euphrosyne armadillo*, *Phyllodoce* sp., *Typosyllis hyalina*, *Odontosyllis fulgurans*, *Neanthes caudata*, *Nereis rava* (4), *Ceratonereis mirabilis* (3), *Ceratonereis* sp., *Glycera rouxii*, *Eunice vittata* (17), *Eunice tubifex*, *Hyalinoecia bilineata*, Maldanidae sp., *Owenia fusiformis*, *Amphicteis gunneri* (2), *Serpula* (*Paraserpula*) *israelitica*.

**Station 11** : vases molles à 60-63 m de profondeur avec de rares blocs et pas de végétation. Prélèvements à la benne de Petersen.

*Glycera rouxii*, *Drilonereis filum*, Lumbrinerinae et Eunicinae sp., *Tharyx heterochaeta*, *Pseudoleiocyathella fauveli*, *Clumene gracilis*, Maldanidae sp., *Amphicteis gunneri*, *Serpula* (*Paraserpula*) *israelitica*... et des Phoronidiens.

**Station 12** : fond de vase avec nombreux blocs biogènes, formations algales peu importantes ; des Éponges en épiphytes ou épibiontes. Profondeur : 66 m. Prélèvement à la benne ou au chalut.

*Phyllodoce vittata*, *Haplosyllis spongicola* (4), *Syllis gracilis*, *Typosyllis hyalina* (2), *Ceratonereis costae*, *Nephtys hystrix*, *Glycera tessellata* (3), *Eunice vittata* (2), *Lysidice ninetta* (2), *Hyalinoecia fauveli*, Lumbrineris adriatica (2), Eunicidae sp., Maldanidae sp., *Terebella lapidaria*, *Nicolea venustula*, *Polycirrus caliendrum* (3), *Terebellides stroemi*, *Serpula vermicularis*, *Serpula conchurum*, *Hydroides pseudouncinata*, *Vermiliopsis infundibulum*, *Protula tubularia*.

**Station 13** : fond de vase molle à 68 m de profondeur, avec de rares blocs biogènes sans végétation. Prélèvements à la drague ou au chalut.

*Leanira yhleni*, *Eupanthalis kinbergi*, *Hermodice carunculata*, *Eunice vittata* (2), *Polymnia nesidensis*, *Terebellides stroemi* (2), *Potamilla torelli*, *Potamilla reniformis* (3), *Serpula conchurum*, *Protula tubularia*.

**Station 14** : vases molles à 73 m sans blocs ni végétation. Prélèvements à la benne, à la drague et au chalut.

*Leanira yhleni*, *Eunice vittata*, *Leiochone tricirrata*, Maldanidae sp., *Sternaspis scutata*, *Amphicteis gunneri*, *Dasychone lucullana*.

**Station 15** : vases à 70-73 m, avec nombreux blocs biogènes. Prélèvements à la benne, au chalut ou à la drague.

*Acholoe astericola*, *Bhavanianus reyssi* (6), *Typosyllis hyalina*, *Glycera tessellata* (2), *Glycera unicornis*, *Eunice torquatu*, *Eunice vittata* (12), Eunicidae sp., Lumbrineris gracilis, *Staurophephalus rubrovittatus*, Maldanidae sp., *Rhodine gracilior*.

**Station 16** : vases molles à 70 m avec quelques blocs et Éponges. Chalutages.

*Hermione hystrix* (5), *Hermodice carunculata*, *Trypanosyllis zebra*, *Eunice vittata* (2), *Polymnia nesidensis* (2), *Nicolea venustula* (2), Sabellinae sp., *Serpula vermicularis*, *Vermiliopsis richardi*, *Protula tubularia*.

**Station 17** : vases molles à 77 m de profondeur, avec de rares blocs biogènes. Prélèvements à la benne, à la drague et au chalut.

*Nephtys* sp., *Glycera rouxii*, *Hyalinoecia fauveli*, Lumbrineris gracilis, *Spiophanes kroyeri* reyssi, *Prionospio ehlersi*, *Paraonis gracilis*, *Aricidea* sp., *Tharyx marioni*, *Tharyx heterochaeta* (2), *Clumene gracilis* (2), *Leiochone tricirrata* (3), *Rhodine gracilior*, *Pista* sp., Sabellinae sp... et des Phoronidiens.

**Station 18** : vases molles à 66 m, avec de nombreux blocs et des Éponges. Drague et chalut.

*Hermodice carunculata* (2), *Hyalinoecia fauveli*, Eunicidae sp.

**Station 19** : vases molles à 65 m, avec de nombreux blocs et Éponges. Prélèvements à la benne de Petersen ou au chalut à perche.

*Paralacydonia paradoxa* (2), *Typosyllis armillaris*, *Nereis rava*, *Ceratonereis mirabilis*, *Eunice vittata* (7), *Marphysa bellii*, *Lysidice ninetta*, *Hyalinoecia fauveli*, *Hyalinoecia brementi* (2), *Tharyx heterochaeta*, *Sclerocheilus minutus*, *Clumene lumbricoides*, *Rhodine gracilior* (2), *Pista* sp., *Serpula* (*Paraserpula*) *israelitica*.

***Serpula* (*Paraserpula*) *israelitica* n. sp.**  
(Fig. 2)

Cinq exemplaires de cette collection doivent figurer dans cette nouvelle espèce. Un seul est entier et en bon état, avec son panache et une partie importante du tube. Pour le conserver, nous avons prélevé sur les autres exemplaires les éléments nécessaires à l'analyse des soies en particulier. La description synthétise donc les observations faites sur l'ensemble des cinq *Serpulidae*.




FIG. 2. — *Serpula* (*Paraserpula*) *israelitica* n. sp. : a, région antérieure de l'animal ; b, les deux types de soies du premier sétigère ; c, uncinus du thorax.

*Tube*

Calcaire peu épais et friable ; il est parfaitement lisse, d'un blanc laiteux, sans aucune ornementation, long de 2 à 4 cm sur les fragments présents où le diamètre demeure constant et la section cylindrique est d'environ 1,5 mm.

*Panache*

De petite taille, au maximum 4-5 mm ; il n'était présent que sur trois exemplaires. Le premier filament dorsal operculaire est lisse, un peu plus long que les autres et il se termine par l'entonnoir à face supérieure concave, avec une bordure de 40 à 60 dentelures arrondies, subégales, séparées les unes des autres par des côtes rayonnantes, aussi bien à la face interne qu'à la face externe. La symétrie est radiaire sans doute possible. Sur deux exemplaires, l'opercule est porté par le premier filament gauche, le premier droit est alors un court filament lisse dilaté en massue. Sur le troisième, l'opercule est au premier filament droit et la massue à gauche.

Les autres filaments, 10 à 12 par demi-panache, portent de fines barbulles et se terminent en pointe grêle et nue.

*Corps*

L'animal est plus grêle que les *Serpula vermicularis* ou *S. concharum* : l'exemplaire entier, par exemple, mesure un peu plus de 4 cm de long et seulement 1,5 mm de diamètre au thorax.

*Membrane thoracique*

Elle forme une ample collerette supérieure trilobée. Le lobe ventral entier est largement rabattu vers la partie inférieure ; les lobes latéraux encapuchonnent plus ou moins les soies du premier sétigère (collar-setae) et se continuent avec la membrane latérale thoracique qui, de chaque côté, recouvre les pieds et forme, à la partie ventrale inférieure du thorax, une large lamelle libre par-dessus les premiers segments abdominaux.

*Soies*

Le thorax compte, selon les individus, 7, 8 ou 9 sétigères.

Au premier sétigère, il n'y a pas d'uncini, mais deux sortes de soies capillaires. Quatre ou cinq, assez épaisses, à partie proximale bien droite, lisse ; vient ensuite une épine distale infléchi par rapport à la région précédente et de largeur nettement moindre dès l'origine. Nous n'avons pas remarqué l'aspect ehagriné ou légèrement épineux qu'ont observé E. C. SOUTHWARD et H. ZIBROWIUS pour leurs *Paraserpula planorbis* et *Serpula massiliensis*. A ces 4-5 soies épaisses s'ajoutent 7 à 9 soies capillaires moitié plus fines.

Aux segments sétigères thoraciques suivants, on a des soies capillaires beaucoup plus nombreuses, les unes limbées, les autres non et des uncini avec une très forte dent antérieure surmontée de 7 à 9 dents égales entre elles et disposées en scie.

A l'abdomen, on retrouve des rames avec uncini assez semblables aux précédents mais avec des dents un peu plus nombreuses et disposées, cette fois, en râpe et non en scie (sauf peut-être aux tout premiers segments abdominaux). Il s'y ajoute un bouquet d'une dizaine de soies terminées en calice comprimé, dentelé comme dans l'ensemble des *Serpula*.

*Justification de l'appellation*

Par son opercule très caractéristique, cette espèce nous semble devoir être maintenue dans le genre *Serpula*. Par ses soies du premier sétigère, elle s'écarte très nettement des

espèces anciennement connues et courantes, *S. vermicularis* et *S. concharum* notamment. Le terme de *Paraserpula* connote à la fois la ressemblance et l'opposition, aussi nous a-t-il paru intéressant de le conserver, avec rang de sous-genre. Quant à la désignation spécifique, elle indique le lieu d'invention des premières captures : les rivages méditerranéens d'Israël.

L'espèce s'apparente ainsi aux *Paraserpula planorbis* Southward, 1963, dont elle diffère par la forme du tube et des anneaux thoraciques, entre autres, sans parler des distributions géographiques.

#### REMARQUES ET CONCLUSIONS

Peu de chercheurs se sont appliqués jusqu'ici à l'étude des Annélides Polychètes de ces régions : nous ne pouvons guère citer d'autres travaux que ceux de MONRO (1937), FAUVEL (1955 et 1957) qui incorpore dans son premier article les espèces trouvées par MONRO ou déterminées par celui-ci dans les collections de Jérusalem, TEEBLE (1959) et LAUBIER (région de Beyrouth, 1966).

En comparant la liste des espèces recueillies par MOSHE TOM en cette région avec les listes des auteurs ci-dessus, nous constatons que :

— 36 des 100 espèces présentes ici ne figuraient pas dans les découvertes précédentes : *Scalissetosus pellucidus*, *Acholoe astericola*, *Eupanthalis kinbergi*, *Euphrosyne armadillo*, *Phyllodoce vittata*, *Paralacydonia paradoxa*, *Odontosyllis fulgurans*, *Leptonereis glauca*, *Ceratonereis mirabilis*, *Glycera capitata*, *Eunice tubifex*, *Marphysa bellii*, *Hyalinoecia grubii*, *H. fauveli*, *H. brementi*, *Lumbrineris adriatica*, *Scoloplos chevalieri candiensis*, *Spiophanes kroyeri reysii*, *Paraonis gracilis*, *Paradoneis armata*, *Tharyx heterochaeta*, *Sclerocheilus minutus*, *Leiocapitella dollfusi*, *Pseudoleiocapitella fauveli*, *Clymene oerstedii*, *Lagis koreni*, *Terebella lapidaria*, *Polycirrus caliendrum*, *Potamilla reniformis*, *Laonome* sp., *Jasmineira elegans*, *Serpula concharum*, *Serpula (Paraserpula) israelitica*, *Hydroides pseudouncinata*, *Vermiliopsis infundibulum*.

— Parmi ces espèces, nous notons que deux d'entre elles étaient jusqu'ici inconnues de la Méditerranée, alors qu'elles étaient citées à maintes reprises dans la Mer Rouge : *Ceratonereis mirabilis* et *Eunice tubifex*.

— Enfin une troisième espèce, parmi les 36 nouvelles pour la région, semble totalement inconnue précédemment : *Serpula (Paraserpula) israelitica*.

La collection était peu importante par le nombre d'individus qu'elle comprenait ; elle s'est avérée fort intéressante et enrichissante par les éléments nouveaux qu'elle a apportés.

#### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AMOUREUX, L., 1973. — Liste de nouvelles espèces d'Annélides Polychètes. *Rapp. P.-V. Réun. Commn. int. Explor. scient. Mer Méditerr.*, **21** (9) : 665-667.
- BELLAN, G., 1964. — Contribution à l'étude systématique, bionomique et écologique des Annélides Polychètes de la Méditerranée. Thèse Univ. Marseille : 371 p.
- BELLAN, G., et J. REYS, 1967. — *Leiochone tricirrata*, n. sp., une Maldanidae nouvelle de la région de Marseille. *Bull. Soc. zool. Fr.*, **92** : 199-206.

- FAUVEL, P., 1923. — Faune de France. V — Polychètes Errantes. Paris.
- 1927. — Faune de France. XVI — Polychètes Sédentaires. Paris.
- 1940. — Annélides Polychètes de la Haute Adriatique. *Thalassia*, **4** : 1-24.
- 1955. — Contribution à la faune des Annélides Polychètes des côtes d'Israël. *Sea Fish. Res. Bull.*, **10** : 1-12.
- 1957. — Contribution à la faune des Annélides Polychètes des côtes d'Israël II. *Bull. Res. Coun. Israel*, **6 B** : 213-219.
- HARMELIN, J. G., 1964. — Étude de l'endofaune des « mattes » de *Posidonia oceanica* (Delile). *Recl. Trav. Stn mar. Endoume*, **35** : 43-106.
- 1969. — Contribution à l'étude de l'endofaune des prairies d'*Halophila stipulacea* de Méditerranée orientale. I Annélides Polychètes. *Recl. Trav. Stn mar. Endoume*, **45** : 304-316.
- KATZMANN, W., L. LAUBIER et J. RAMOS, 1974. — Une nouvelle espèce méditerranéenne de Chrysopetalidae (Annélides Polychètes). *Annln naturh. Mus. Wien*, **78** : 313-317.
- LAUBIER, L., 1966. — Sur la position systématique de *Monticellina heterochaeta* Laubier, 1961. *Bull. Soc. zool. Fr.*, **91** : 631-638.
- 1966. — Sur quelques Annélides Polychètes de la région de Beyrouth. *Misc. Pap. Nat. Sci. American Univ. Beirut*, n° 5.
- MONRO, C. C. A., 1937. — A note on a collection of Polychaeta from the Eastern Mediterranean. *Ann. Mag. nat. Hist.*, London, ser. 10, **17** : 82-86.
- RULLIER, F., 1963. — Les Annélides Polychètes du Bosphore, de la mer de Marmara et de la mer Noire, en relation avec celles de la Méditerranée. *Rapp. P.-V. Réun. Commn. int. Explor. scient. Mer. Méditerr.*, **17** (2) : 161-260.
- SOUTHWARD, E. C., 1963. — Some new and little-known Serpulid Polychaetes from the continental slope. *J. mar. biol. Ass. U. K.*, **43** : 573-587.
- TEEBLE, N., 1959. — On a collection of Polychaetes from the Mediterranean coast of Israel. *Bull. Res. Coun. Israel*, **8 B** (1).
- ZIBROWIUS, H., 1968. — Étude morphologique, systématique et écologique des Serpulidae (Annélida Polychaeta) de la région de Marseille. *Recl. Trav. Stn mar. Endoume*, **43** (59) : 81-252.

*Manuscrit déposé le 13 février 1976.*

*Bull. Mus. natn. Hist. nat., Paris*, 3<sup>e</sup> sér., n° 404, sept.-oct. 1976,  
Zoologie 281 : 1047-1059.

*Achévé d'imprimer le 28 février 1977.*

IMPRIMERIE NATIONALE

---

6 564 004 5







## Recommandations aux auteurs

Les articles à publier doivent être adressés directement au Secrétariat du *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. Ils seront accompagnés d'un résumé en une ou plusieurs langues. L'adresse du Laboratoire dans lequel le travail a été effectué figurera sur la première page, en note infrapaginale.

Le *texte* doit être dactylographié à double interligne, avec une marge suffisante, recto seulement. Pas de mots en majuscules, pas de soulignages (à l'exception des noms de genres et d'espèces soulignés d'un trait).

Il convient de numérotter les *tableaux* et de leur donner un titre ; les tableaux compliqués devront être préparés de façon à pouvoir être clichés comme une figure.

Les *références bibliographiques* apparaîtront selon les modèles suivants :

BAUCHOT, M.-L., J. DAGET, J.-C. HUREAU et Th. MONOD, 1970. — Le problème des « auteurs secondaires » en taxinomie. *Bull. Mus. Hist. nat., Paris*, 2<sup>e</sup> sér., 42 (2) : 301-304.

TINBERGEN, N., 1952. — *The study of instinct*. Oxford, Clarendon Press, 228 p.

Les *dessins* et *cartes* doivent être faits sur bristol blanc ou calque, à l'encre de chine. Envoyer les originaux. Les *photographies* seront le plus nettes possible, sur papier brillant, et normalement contrastées. L'emplacement des figures sera indiqué dans la marge et les légendes seront regroupées à la fin du texte, sur un feuillet séparé.

Un auteur ne pourra publier plus de 100 pages imprimées par an dans le *Bulletin*, en une ou plusieurs fois.

Une seule épreuve sera envoyée à l'auteur qui devra la retourner dans les quatre jours au Secrétariat, avec son manuscrit. Les « corrections d'auteurs » (modifications ou additions de texte) trop nombreuses, et non justifiées par une information de dernière heure, pourront être facturées aux auteurs.

Ceux-ci recevront gratuitement 50 exemplaires imprimés de leur travail. Ils pourront obtenir à leur frais des fascicules supplémentaires en s'adressant à la Bibliothèque centrale du Muséum : 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris.

---

